E	Campo obbligatorio ai fini dell'eleggibilità	ZEPATIER (elbasvir/grazoprevir)
O	Campo obbligatorio	Epatite C cronica

ZEPATIER è indicato per il trattamento dell'epatite C cronica (chronic hepatitis C, CHC) nei pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni con un peso di almeno 30 kg (vedere paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1).
Per l'attività specifica per il genotipo del virus dell'epatite C (hepatitis C virus, HCV) vedere paragrafi 4.4 e 5.1.

1- Scheda Registrazione paziente (RP)

E	Età	≥12 aa
---	-----	--------

2- Scheda Eleggibilità e Dati Clinici (EDC)

Per avvertenze, controindicazioni e modo di somministrazione del farmaco, fare riferimento al Riassunto delle caratteristiche del prodotto di Zepatier.

E	CHC Genotipo (combobox)	1a	
		1b	
		2	blocco
		3	blocco
		4	
		5	blocco
		6	blocco
	Altro (misti)	blocco	

O	Valore HCV-RNA quantitativo	...
O	Data del HCV-RNA	.././....
O	Metodica utilizzata	Abbott Real Time (limit 12 IU/mL) Roche Taqman (limit 15 IU/mL) Altro
O	Se Altro specificare	...

3- Scheda Richiesta Farmaco (RF)

O	Data richiesta farmaco	.././....
O	Peso corporeo (Kg)	...
O	Dose richiesta (mg/die)	50/100
O	Dose totale richiesta (mg) (calcolo in automatico per 28 giorni)	1400/2800

blocca se < 30 kg

O	Ci sono state reazioni nocive e non volute correlate al medicinale	Si No	Link RNFV (dalla RF2 in poi)
---	--	----------	------------------------------

O	Schema terapeutico	Elba/grazo 12 SETT	
		Elba/grazo 16 SETT + Riba	
		Elba/grazo + Sofosbuvir + Riba 12 SETT	
		Elba/grazo + Sofosbuvir + Riba 24 SETT	

O	Indicare se è presente ribavirina (*) nell'associazione con Zepatier	Si No
---	--	----------

(*) Per istruzioni sul dosaggio specifiche per ribavirina, compresa la variazione della dose, fare riferimento al Riassunto delle caratteristiche del prodotto di ribavirina

4- Scheda Dispensazione Farmaco (DF)

O	Data dispensazione farmaco	.././....
---	----------------------------	-----------

	Lista AIC Zepatier	Numero di confezioni/partizionamento
O	044929014/E; 50 mg/100 mg compresse rivestite con film - uso orale- blister (ALL/ALL)- 28 COMPRESSE	

5- Scheda Rivalutazione (RIV)

La valutazione della carica virale in corso di trattamento non è clinicamente rilevante e pertanto le schede di Rivalutazione sono opzionali.		<i>testo fisso</i>
O	Data di RIV	.././....
O	Ci sono state reazioni nocive e non volute correlate al medicinale	Si
		No
<i>Link RNFV</i>		
O	Valore HCV-RNA quantitativo	...
O	Data del HCV-RNA	.././....
<i>Vedi schema RIV</i>		
O	Metodica utilizzata	Abbott Real Time (limit 12 IU/mL)
		Roche Taqman (limit 15 IU/mL)
		<i>Altro</i>
O	<i>Se Altro specificare</i>	...

E	Il paziente continua la terapia	Si
		No
<i>inserire FT</i>		

6- Scheda Fine Trattamento (FT)

O	Data di FT	.././....
O	Valore HCV-RNA quantitativo	...
O	Data del HCV-RNA	.././....
O	Metodica utilizzata	Abbott Real Time (limit 12 IU/mL)
		Roche Taqman (limit 15 IU/mL)
		<i>Altro</i>
O	<i>Se Altro specificare</i>	...

O	Il trattamento è stato completato secondo programma terapeutico	Si
		No
O	<i>Se No, specificare la causa:</i>	<i>Non risposta virologica</i>
		Tossicità al medicinale
		Perso al follow up
		<i>Decisione medica</i>
		<i>Trapianto di fegato</i>
		<i>Trapianto di organo solido (non fegato) o midollo</i>
		Decisione del paziente
		<i>Decesso</i>
<i>Link RNFV</i>		

Attenzione! La prescrizione di questo medicinale è consentita ai soli medici appartenenti a strutture ospedaliere e sanitarie territoriali espressamente autorizzate dalla Regione di rispettiva pertinenza.